Médicament L 52

Dans quel cas le médicament L 52 est-il prescrit ?

Ce médicament est un complexe (association) de composants homéopathiques.
Il est utilisé dans le traitement homéopathique des états grippaux (courbatures, toux sèche) et fatigue post-grippale.

Présentations du médicament L 52

L 52 : solution buvable ; flacon compte-goutte de 30 ml (1200 gouttes)

Composition du médicament L 52

Eupatorium perfoliatum 3 DH, Aconitum napellus 4 DH, Bryonia 3DH, Arnica montana 4 DH, Gelsemium sempervirens 6 DH, China rubra 4 DH, Belladonna 4DH, Drosera rotundifolia 3 DH, Polygala senega 3 DH aa 80 %. Eucalyptus globulus 1 DH 20 % ; alcool.
Substances actives : Aconitum napellus, Arnica montana, Atropa belladonna, Bryonia alba, Cinchona, Drosera, Eucalyptus globulus,Eupatorium perfoliatum, Gelsemium sempervirens, Polygala senega
Excipient : Éthanol
Attention Ce médicament contient de l'alcool : 278 mg d'alcool dans 20 gouttes, ce qui correspond à 7 ml de bière ou 3 ml de vin.

Fertilité, grossesse et allaitement

Aux dilutions homéopathiques, les substances contenues dans ce médicament ne sont pas connues pour être toxiques pendant la grossesse ou l'allaitement.

Mode d'emploi et posologie du médicament L 52

Ce médicament est pris de préférence en dehors des repas.
Les gouttes doivent être diluées dans un peu d'eau et gardées quelques secondes sous la langue.
Posologie usuelle :
Prévention :

- Adulte : 20 gouttes, 2 fois par jour.
- Enfant de plus de 2 ans : 5 à 10 gouttes, 2 fois par jour, selon l'âge.

État grippal :

- Adulte : 20 gouttes, 5 à 8 fois par jour.
- Enfant de plus de 2 ans : 5 à 10 gouttes, 5 à 8 fois par jour, selon l'âge.

État post-grippal :

- Adulte : 20 gouttes, 3 fois par jour.
- Enfant de plus de 2 ans : 5 à 10 gouttes, 3 fois par jour, selon l'âge.

Laboratoire Lehning

Merci de nous contacter pour toute demande ou interrogation.

Pharmacie Paget
2 rue Pasteur
81990 Puygouzon

Tél 05.63.54.11.02
Fax 05.63.38.96.10
pharmacie.paget@yahoo.fr

Votre santé, notre priorité

Si vos symptômes persistent, contactez votre médecin.